Preparazione alla Prova Nazionale delle Olimpiadi della Fisica
(Senigallia 2014)

MECCANICA
PROBLEMI SCELTI

Federico Grasselli (UniMoRe)

26 Marzo 2014

1 Pendolo a rimbalzo

Una pallina è attaccata ad un filo inestensibile di massa trascurabile lungo l come in figura. Il muro a cui è appeso il filo è inclinato di un angolo α rispetto alla verticale. Inizialmente il filo viene spostato di un angolo $\beta > \alpha$ e poi rilasciato.

Assumendo che le collisioni della pallina contro il muro siano perfettamente elastiche, trovare il periodo di oscillazione di tale pendolo.

Si lavori in approssimazione di piccoli angoli.

Soluzione

$$T = 2\sqrt{\frac{l}{g}} \left[\frac{\pi}{2} + \text{asin} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) \right] \quad (1)$$

2 Oscillazioni armoniche di un cilindro

Un cilindro rigido di raggio R e massa m esegue delle piccole oscillazioni in seguito all'azione di un sistema a due molle la cui costante di molla efficace combinata è κ .

Trovare il periodo delle piccole oscillazioni in assenza di slittamento.

Soluzione

$$T = \pi \sqrt{\frac{3m}{2\kappa}} \quad (2)$$

3 Molecola di anidride carbonica

Un modello per descrivere la molecola di CO_2 consiste in tre palline interconnesse da molle identiche prive di massa situate lungo l'asse della molecola (la CO_2 è lineare). Un sistema di tale tipo può oscillare nei due modi descritti in figura. Sapendo le masse degli atomi, trovare il rapporto tra le frequenze dei due tipi di oscillazione.

Soluzione

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{1 + \frac{2M}{m}} \approx 1,91 \quad (3)$$

4 Potenziale centrale elastico

Una particella si muove lungo una traiettoria chiusa in un campo centrale di energia potenziale $U = kr^2$, dove k è una costante positiva ed r è la distanza della particella dal centro O .

Trovare la massa della particella se la sua distanza minima dal punto O è r_1 e la sua velocità nel punto più distante da O è pari a v_2 .

Soluzione

$$m = 2k \frac{r_1^2}{v_2^2} \quad (4)$$

5 Moto di una corda pesante

Una corda pesante omogenea AB lunga l è posta in un tubo orizzontale *liscio* in modo tale che una frazione della corda lunga h è libera e tocca la superficie di un tavolo, posto orizzontalmente sotto al tubo, con l'estremo libero B . Ad un certo istante l'estremo A è lasciato anch'esso libero. Con quale velocità l'estremo A uscirà dal tubo?

Soluzione

$$v_A^{fin} = \sqrt{2hg \ln\left(\frac{l}{h}\right)} \quad (5)$$

6 Moto planare

Un piccolo corpo di massa m legato ad un filo inestensibile si muove su un piano liscio orizzontale. L'altro capo del filo è tirato, tramite un foro nel piano, a velocità costante.

Si determini la tensione $\mathfrak{T}(r)$ del filo in funzione della distanza r tra il corpo e il foro se per un certo $r = r_0$ la velocità angolare di m è $\omega = \omega_0$.

Soluzione

$$\mathfrak{T}(r) = m\omega_0^2 r_0^4 \frac{1}{r^3} \quad (6)$$

7 Problema di Keplero

Un pianeta di massa m si muove lungo un'ellissi attorno al Sole. L'afelio e il perielio sono rispettivamente r_1 e r_2 .

Trovare il momento angolare $\mathfrak{L}$ di questo pianeta rispetto al centro del Sole.

Soluzione

$$\mathfrak{L} = m\sqrt{2\gamma M \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}} \quad (7)$$

dove γ è la costante di gravitazione universale.

8 Campo gravitazionale per sistemi cavi

All'interno d'una sfera uniforme di densità ρ c'è una cavità sferica il cui centro è ad una distanza l dal centro della sfera.

Trovare l'intensità $\mathbf{G}$ del campo gravitazionale all'interno della cavità.

Soluzione

$$\mathbf{G} = -\gamma \frac{4}{3} \pi \rho \mathbf{l} \quad (8)$$

dove γ è la costante di gravitazione universale.

9 Momento d'inerzia per figure cave

Un disco uniforme di raggio R ha un taglio a forma di cerchio (v. fig.). La massa della porzione restante, ombreggiata in figura, è m .

Trovare il momento d'inerzia dell'oggetto descritto rispetto all'asse passante per il suo centro di massa e perpendicolare al piano del disco.

Soluzione

$$I_C = \frac{37}{72} m R^2 \quad (9)$$

10 Azione dell'attrito su un cilindro in rotazione

Un cilindro uniforme di raggio R è messo in rotazione attorno al proprio asse con velocità angolare ω_0 e poi posto in un angolo (v. fig.). Il coefficiente d'attrito tra le pareti del muro e il cilindro è uguale a k .

Qual è il numero n di giri compirà il cilindro prima di fermarsi?

Soluzione

$$n = \frac{1}{8\pi} \frac{\omega_0^2 R}{g} \frac{1+k^2}{k(k+1)} \quad (10)$$

11 Cilindro nel cilindro

Determinare il periodo delle piccole oscillazioni di un cilindro di raggio r , soggetto alla gravità, che rotola senza strisciare sulla superficie interna di un altro cilindro di raggio $R > r$.

Soluzione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3}{2} \frac{R-r}{g}} \quad (11)$$